



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE CORSE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA REGION CORSE

Spécial n°28 du 04 août 2015

SOMMAIRE

15-0580	arrêté du 30 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de <i>Xylella Fastidiosa</i> en Corse
15-0581	arrêté du 24 juillet 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de <i>Xylella Fastidiosa</i> et les mesures de lutte applicables
15-0582	arrêté du 31 juillet 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de <i>Xylella Fastidiosa</i> et les mesures de lutte applicables ;
15-0583	arrêté du 1er août 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de <i>Xylella Fastidiosa</i> et les mesures de lutte applicables.



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse

Arrêté du 30 avril 2015 n°15-0580

Relatif à la prévention de l'introduction de *Xylella fastidiosa* en Corse

*Le préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,*

- Vu la directive 2000/29/CE modifiée du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
- Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.251-3 à L. 251-20 et D. 251-1 à R. 251-41 ;
- Vu l'article L 442-8 du code du commerce ;
- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- Vu le décret du Président de la République du 14 juin 2013 portant nomination de M. Christophe MIRMAND en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
- Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets
- Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;
- Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ;
- Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2015 relatif à la prévention de l'introduction de *Xylella fastidiosa* (Well and Raju) ;
- Vu la procédure engagée par l'Etat en vue d'obtenir le statut de zone protégée contre la bactérie *Xylella fastidiosa* ;
- Vu l'avis du Comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale du 30 avril 2015 ;

*Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe dont l'introduction et la dissémination sont interdites, et un danger sanitaire classé en catégorie 1 par l'arrêté du 15 décembre 2014 ;*

Considérant que la commercialisation des végétaux est interdite par tout établissement producteur ou importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets, tout magasin collectif et centre d'expédition de fruits d'agrumes, définis par l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié, qui ne serait pas inscrit sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire ;

Considérant le renforcement, depuis octobre 2013, des contrôles effectués sur les ports de commerce et aéroports de Corse-du-Sud et de Haute-Corse afin de vérifier la nature, l'origine et l'état sanitaire des végétaux introduits sur le territoire par des professionnels et des particuliers, mais également auprès des revendeurs de végétaux non itinérants, et sur axes routiers afin de vérifier la nature, l'origine et l'état sanitaire des végétaux commercialisés en bord de route ;

*Considérant que les conditions agro-pédo-climatiques de la Corse sont particulièrement favorables à l'établissement de la bactérie *Xylella fastidiosa* ;*

Considérant la valeur patrimoniale, économique et environnementale du couvert végétal corse ;

*Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est transmise et dispersée par des insectes vecteurs.*

Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse,

ARRETE

Article 1 – L'introduction des végétaux spécifiés dont la liste figure en annexe est interdite en Corse quelle que soit leur origine.

Article 2 – Par dérogation à l'article 1, une autorisation d'introduction en Corse peut être accordée à des professionnels pour des végétaux destinés à la plantation ou à la vente, à l'exception des végétaux en provenance de zones délimitées vis-à-vis de *Xylella fastidiosa*, de pays tiers reconnus contaminés par *Xylella fastidiosa* ou de statut inconnu.

Ces demandes d'autorisation, instruites au cas par cas par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations compétente pour le point d'introduction en Corse, doivent être déposées au minimum 96 heures avant la date souhaitée d'introduction.

Chaque demande comporte les éléments suivants :

- coordonnées et raison sociale du demandeur
- genre, espèce et quantité de végétaux introduits,
- pays d'origine et identification complète du producteur d'origine,
- adresse du lieu de destination en Corse, date et port d'arrivée, détails du mode de transport.

Les végétaux concernés sont accompagnés de leur passeport phytosanitaire ou d'une attestation officielle délivrée par les services compétents du lieu d'origine.

Ils font l'objet d'un traitement insecticide avec un produit phytosanitaire autorisé pour cet usage, réalisé sur le lieu de production avant conditionnement, attesté par un document précisant la date et le produit appliqué.

Les végétaux dont l'autorisation d'introduction est acceptée ne peuvent être introduits en Corse que par les ports d'Ajaccio ou de Bastia.

En cas d'infraction aux conditions de circulation des végétaux, des peines maximales de deux ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende sont prévues à l'article L 251-20 du code rural et de la pêche maritime.

Il est par ailleurs procédé à la saisie, suivie de destruction, des végétaux qui seraient introduits en Corse sans autorisation.

Article 3 – Tout propriétaire ou détenteur de végétaux spécifiés est tenu d'assurer une surveillance générale de ceux-ci.

En cas de présence ou de suspicion de *Xylella fastidiosa*, il en fait la déclaration immédiatement auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud ou de Haute-Corse, qui réalise une investigation épidémiologique.

En fonction des informations épidémiologiques recueillies, des mesures conservatoires peuvent être mises en œuvre dès la phase de suspicion (destruction du végétal, traitement phytosanitaire, et/ou surveillance renforcée) avec l'accord du propriétaire.

Article 4 - Au cours des contrôles sanitaires diligentés par les services de l'État ou sous leur contrôle, tout végétal suspect d'être contaminé, non accompagné d'un passeport phytosanitaire ou ne provenant pas d'un établissement inscrit au registre officiel du contrôle phytosanitaire est isolé et consigné, par procès-verbal, aux frais du détenteur, par les services d'inspection pour prélèvement à des fins d'analyse.

Article 5 - Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des végétaux en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics.

En cas d'infraction, des peines d'amendes de 5ème classe sont prévues à l'article R 442-2 du code du commerce.

Les végétaux peuvent être consignés, sur procès-verbal, pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois. La juridiction saisie pourra ordonner la confiscation des produits consignés.

Article 6 – Les compagnies maritimes et aériennes assurant des liaisons vers la Corse informent, à bord et sur leur site de réservation en ligne, leurs passagers des risques sanitaires résultant de l'introduction d'organismes nuisibles par le transport des végétaux, grâce à des affiches d'information mises à leur disposition.

Les compagnies maritimes et aériennes informent systématiquement les services de l'État du chargement des bateaux ou avions entre la Corse et l'Italie, ainsi que des cargaisons échangées avec le reste du territoire national.

Des affiches sont fournies aux revendeurs de végétaux pour l'information de leur clientèle.

Article 7 – Le préfet de Haute-Corse, le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de la sécurité publique, le directeur régional des douanes, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la région de gendarmerie et les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Article 8 – Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mai 2015.

L'arrêté n° 2014267-0004 du 24 septembre 2014 portant sur les mesures de prévention applicables à la circulation des végétaux en Corse-du-Sud et l'arrêté n° 2014267-0006 du 24 septembre 2014 portant sur les mesures de prévention applicables à la circulation des végétaux en Haute-Corse sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Fait à Ajaccio, le 30 AVR. 2015

Le Préfet de Corse,


Christophe MIRMAND

Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

ANNEXE
LISTE DES VEGETAUX SPECIFIES AU SENS DE L'ARTICLE 1

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.
Acer
Aesculus
Agrostis gigantea Roth
Albizia julibrissin Durazz.
Alnus rhombifolia Nutt.
Alternanthera tenella Colla
Amaranthus blitoides S. Watson
Ambrosia acanthicarpa Hook.
Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrosia trifida L.
Ampelopsis arborea (L.) Koehne
Ampelopsis cordata Michx.
Artemisia douglasiana Hook.
Artemisia vulgaris var. *heterophylla* (H.M. Hall & Clements) Jepson
Avena fatua L.
Baccharis halimifolia L.
Baccharis pilularis DC.
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.)
Bidens pilosa L.
Brachiaria decumbens (Stapf)
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.
Brassica
Bromus diandrus Roth
Callicarpa americana L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Carex
Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch
Cassia tora (L.) Roxb.
Catharanthus
Celastrus orbiculata Thunb.
Celtis occidentalis L.
Cenchrus echinatus L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium quinoa Willd.
Chionanthus
Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura
Citrus
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea
Commelina benghalensis L.
Conium maculatum L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist

Cornus florida L.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus eragrostis Lam.
Cyperus esculentus L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Datura wrightii Regel
Digitaria horizontalis Willd.
Digitaria insularis (L.) Ekman
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants
Duranta erecta L.
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eriochloa contracta Hitchc.
Erodium
Escallonia montevidensis Link & Otto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus globulus Labill.
Eugenia myrtifolia Sims
Euphorbia hirta L.
Fagus crenata Blume
Ficus carica L.
Fragaria vesca L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus dipetala Hook. & Arn.
Fraxinus latifolia Benth.
Fraxinus pennsylvanica Marshall
Fuchsia magellanica Lam.
Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson
Geranium dissectum L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.
Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
Hibiscus syriacus L.
Hordeum murinum L.
Hydrangea paniculata Siebold
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Juglans
Juniperus ashei J. Buchholz
Koeleria bipinnata Franch.
Lactuca serriola L.
Lagerstroemia indica L.

Lavandula dentata L.
Ligustrum lucidum L.
Lippia nodiflora (L.) Greene
Liquidambar styraciflua L.
Liriodendron tulipifera L.
Lolium perenne L.
Lonicera japonica (L.) Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Malva
Marrubium vulgare L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus
Melissa officinalis L.
Metrosideros
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Montia linearis (Hook.) Greene
Morus
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Nicotiana glauca Graham
Olea europaea L.
Origanum majorana L.
Paspalum dilatatum Poir.
Persea americana Mill.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus
Pluchea odorata (L.) Cass.
Poa annua L.
Polygala myrtifolia L.
Polygonum arenastrum Boreau
Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre
Polygonum persicaria Gray
Populus fremontii S. Watson
Portulaca
Prunus
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai
Quercus
Ranunculus repens L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Rhamnus alaternus L.

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray
Rosa californica Cham. & Schldl.
Rosmarinus officinalis L.
Rubus
Rumex crispus L.
Salix
Salsola tragus L.
Salvia mellifera Greene
Sambucus
Sapindus saponaria L.
Schinus molle L.
Senecio vulgaris L.
Setaria magna Griseb.
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.
Sisymbrium irio L.
Solanum americanum Mill.
Solanum elaeagnifolium Cav.
Solidago virgaurea L.
Sonchus
Sorghum
Spartium junceum L.
Spermacoce latifolia Aubl.
Stellaria media (L.) Vill.
Tillandsia usneoides (L.) L.
Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene
Trifolium repens L.
Ulmus americana L.
Ulmus crassifolia Nutt.
Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Vaccinium
Verbena litoralis Kunth
Veronica
Vicia faba L.
Vinca
Vitis
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L.



PREFET DE CORSE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse

Arrêté du 24 juillet 2015 n° 15-0581
définissant une zone délimitée vis-à-vis de *Xylella fastidiosa*
et les mesures de lutte applicables

Le préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/789 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 14 juin 2013 portant nomination de M. Christophe Mirmand en qualité de Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autre objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe dont l'introduction et la dissémination sont interdites et un danger sanitaire classé en catégorie 1 par l'arrêté du 15 décembre 2004 ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* peut affecter plus de 200 espèces végétales et causer des dommages majeurs patrimoniaux, économiques et environnementaux ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est transmise et dispersée par des insectes vecteurs ;

Considérant que l'analyse du laboratoire national de référence du 22 juillet 2015 a confirmé la présence de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune de Propriano ;

Considérant que l'identification de la sous espèce et souche de *Xylella fastidiosa* présente dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune de Propriano n'est pas connue à la date d'effet de l'arrêté ;

Considérant qu'il convient de fixer les mesures pour prévenir la propagation de *Xylella fastidiosa*, qui peut être due au mouvement de végétaux contaminés ou par les insectes vecteurs ;

Sur la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse,

ARRETE

Article 1 - Définition

Au sens du présent arrêté, on entend par :

✚ *Xylella fastidiosa*, les isolats européens et non européens de *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ;

- végétaux spécifiés, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 1 ;
- végétaux hôtes, tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 2.

Article 2 – Définition de la zone délimitée

La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.

La zone infectée est d'une distance de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l'objet d'analyses ayant révélé une infection par *Xylella Fastidiosa*.

La zone tampon s'étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La zone délimitée comprend, dans le cas d'espèce, tout ou partie des communes de Arbellara, Belvedere-Campomoro, Bilia, Casalabriva, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Loretto-di-tallano, Moca-Croce, Olmeto, Olmiccia, Petreto-Bicchisano, Propriano, Sartene, Serra-di-Ferro, Sollacaro, Sainte-Lucie-de-Tallano, Santa-Maria-Figaniella, Viggianello.

La délimitation de la zone infectée et de la zone tampon figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 3 – Interdiction de plantation dans la zone infectée

Est interdite dans cette zone la plantation de tout végétal spécifié.

Article 4 – Mesures d'éradication dans la zone infectée

I - Les mesures d'éradication dans la zone infectée doivent être réalisées sans délai et sous la supervision de la DRAAF.

Elles consistent, dans cet ordre, en :

1. un traitement phytopharmaceutique adapté sur la zone infectée.
2. des prélèvements sur les végétaux symptomatiques, sur les végétaux spécifiés à proximité du végétal infecté, et sur les végétaux ayant une origine commune avec le végétal contaminé.
3. la destruction, dans les trois jours suivant la notification administrative, par leurs propriétaires ou détenteurs, de tous les végétaux spécifiés et de tout végétal présentant des symptômes douteux. Les matériels utilisés sont désinsectisés et désinfectés.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du motif d'urgence prévu à l'article L251-14 - II du Code rural et de la pêche maritime ; à ce titre, le propriétaire ou détenteur n'est pas mis en demeure de présenter ses observations.

4. la destruction des végétaux concernés par incinération immédiatement après l'abattage, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée.

En cas de transport des végétaux, ces derniers sont maintenus sous bâche.

En période d'interdiction d'emploi du feu, une dérogation est demandée à l'autorité préfectorale.

En fonction du végétal concerné, cette destruction peut se faire sur place par traitement herbicide autorisé pour l'usage concerné et dans le respect des conditions d'usage.

Les produits issus des abattages doivent être détruits immédiatement pour ceux inférieurs à 7 cm de diamètre, et, par dérogation, dans une période n'excédant pas cinq jours depuis le début de l'opération, pour ceux d'un diamètre supérieurs à 7 cm.

En cas d'inexécution des mesures dans le délai prescrit, la DRAAF fait procéder à l'abattage et à la destruction des végétaux concernés aux frais du propriétaire ou du détenteur, conformément à l'article L251-14-II du Code rural et de la pêche maritime.

II – La circulation des personnes et des véhicules entre la zone infectée et la zone tampon est soumise à restriction tant que les mesures d'éradication ne sont pas terminées.

Article 5 – Mesures de surveillance dans la zone délimitée

La DRAAF organise une surveillance des insectes vecteurs et une prospection des végétaux spécifiés selon une grille de 100 mètres par 100 mètres sur l'ensemble de la zone délimitée.

Dans la zone délimitée, tout propriétaire ou exploitant doit faire réaliser à ses frais une prospection visant à la détection de symptômes de *Xylella fastidiosa*.

Article 6 – Mesures applicables à la circulation de végétaux dans la zone délimitée

Dans la zone délimitée, sont interdits toute sortie et tout mouvement de végétaux, hormis les dispositions de l'article 9 de la décision (UE) 2015/789.

Est admis le transit de végétaux dans la zone délimitée, sans rupture de charge et par un véhicule hermétiquement fermé.

Article 7 – Sanctions en cas d'inexécution du présent arrêté

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

- le fait d'introduire, de détenir sciemment et de transporter la bactérie *Xylella Fastidiosa* ;
- le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les présentes dispositions ;

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

- le fait de ne pas mettre en œuvre les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de la bactérie *Xylella Fastidiosa* dans les délais prescrits.

Article 8 – Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, le préfet de Haute Corse, le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de la sécurité publique, le directeur régional des douanes, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la région de gendarmerie et les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Article 9 – Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juillet 2015.

Fait à Ajaccio, le : 24 JUL. 2015

Le Préfet de Corse,


Christophe MIRMAND

Annexe 1 : liste des végétaux spécifiés

<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Mimosa à longues feuilles, Mimosa chenille
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer</i> sp.	Érables
<i>Aesculus</i> sp.	Marronniers, Paviers
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géant
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Arbre à soie
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aulne blanc
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Alternanthera
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante fausse blette
<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	Franserie lampourde
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambroisie à feuilles d'armoise
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne	Vigne vierge
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	Vigne vierge
<i>Artemisia douglasiana</i> Hook.	Armoise
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>heterophylla</i> (H.M. Hall & Clements) Jepson	Armoise commune
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Sénéçon en arbre
<i>Baccharis pilularis</i> DC.	Baccharis
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.)	Baccharis
<i>Bidens pilosa</i> L.	Sornet, Herbe à aiguilles, Bident hérissé
<i>Brachiaria decumbens</i> (Stapf)	<i>Brachiaria decumbens</i>
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.	<i>Brachiaria plantaginea</i>
<i>Brassica</i> sp.	<i>Brassica</i> (navet, rutabaga, moutarde,...)
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines
<i>Callicarpa americana</i> L.	Callicarpe d'Amérique, Arbre aux bonbons
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse à pasteur
<i>Carex</i> sp.	Carex, Laïches
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Pacancier (noix de Pécan)
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Cassia tora</i>
<i>Catharanthus</i> sp.	Pervenches
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Célastre orbiculaire ou bourreau des arbres
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Cram-cram
<i>Cercis canadensis</i> L.	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Cercis occidentalis</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Chamaecrista fasciculata</i>
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa
<i>Chionanthus</i> sp.	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Chitalpa tashkinensis</i> T. S. Elias & Wisura	Chitalpa de Tashkent
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Citrus</i> sp.	Citrus
<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crête
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Coelorachis cylindrica</i>
<i>Coffea</i> sp.	Caféier
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commeline
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande Ciguë
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette / Vergerolle / Érigéron du Canada
<i>Cornus florida</i> L.	Cornouiller à fleurs, Cornouiller de Floride, Bois de chien
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne de cerf didyme

<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet robuste
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais
<i>Datura wrightii</i> Regel	Datura
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Digitaire, Herbe à blé, Herbe fine
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman	Digitaire
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine
<i>Duranta erecta</i> L.	Vanillier de Cayenne
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Epazote, Fausse ambroisie
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Panic des marais, Panic pied-de-coq, Pied-de-coq
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	Encelia
<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.	Eriochloé contractée, Prairie cupgrass
<i>Erodium</i> sp.	Bees de grue, Erodium
<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto	Escallonia
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gommier de Camaldoli, Gommier des rivières
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus commun, Gommier bleu
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims	Cerisier des Antilles, Myrte d'Australie
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i>
<i>Euphorbia terracina</i> L.	
<i>Fagus crenata</i> Blume	Hêtre du japon
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier comestible ou Figuier commun
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc Frêne
<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn.	Frêne californien
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsia de Magellan
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	Genêt de Montpellier
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées, Géranium découpé
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Gingko
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol
<i>Hemerocallis</i> spp.	Hémérocailles, Lys d'un jour
<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.	Houx de Californie
<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker	Lanterne japonaise
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Althéa, Mauve en arbre
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hydrangea paniculé
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton	Aiton
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Volubilis
<i>Iva annua</i> L.	Iva
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Flamboyant bleu
<i>Juglans</i> spp.	Noyers
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Genévrier Ashe
<i>Koeleria bipinnata</i> Franch.	Savonnier
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage, laitue scariote
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes
<i>Lavandula dentata</i>	Lavande dentée
<i>Ligustrum lucidum</i> L.	Troène de Chine, Troène à feuilles brillantes
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene	Verveine nodiflore
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais

<i>Lonicera japonica</i> (L.) Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie (Jussie) à grandes fleurs, Grande Jussie
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	Lupin buissonnant
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia (Magnolier) à grandes fleurs, laurier-tulipier
<i>Malva</i> sp.	Mauves
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube blanc, Marrube Commun
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzeerne à fruits nombreux
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzeerne, Alfalfa
<i>Melilotus</i> sp.	Métilots
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale
<i>Metrosideros</i> sp.	Metrosideros, Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Mauve de Caroline
<i>Montia linearis</i> (Hook.) Greene	Montie linéaire
<i>Morus</i> sp.	Mûriers
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nandina domestica</i> Murray	Bambou sacré
<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	Neptunia jaune
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabac glauque, Tabac arborescent
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Origanum majorana</i> L.	Marjolaine, Origan des jardins
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis, Millet bâtard
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmier du Sénégal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Faux dattier, Dattier nain, Dattier du Mékong
<i>Pinus taeda</i> L.	Pin à encens
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé, Plantain étroit
<i>Platanus</i> sp.	Platanes
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Géri tout
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Polygonum lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Polygonum persicaria</i> Gray	Renouée persicaire
<i>Populus fremontii</i> S. Watson	Peuplier de Fremont
<i>Portulaca</i> sp.	Pourpriers
<i>Prunus</i> sp.	Prunus
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Nashi
<i>Quercus</i> sp.	Chênes
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante, Bouton d'or
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray	Sumac de l'Ouest
<i>Rosa californica</i> Cham. & Schldl.	Rosier de Californie
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Rubus</i> sp.	Ronces
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue
<i>Salix</i> sp.	Saules
<i>Salsola tragus</i> L.	Soude roulante
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge mellifère
<i>Sambucus</i> sp.	Sureaux
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier
<i>Schinus molle</i> L.	Faux-poivrier


<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun
<i>Setaria magna</i> Griseb.	<i>Setaria magna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon-Marie
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C. K. Schneid.	Jojoba
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Roquette jaune
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Brède morelle, Morelle d'Amérique
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Morelle jaune, Morelle à feuilles de châtaf
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Sonchus</i> sp.	Laiterons
<i>Sorghum</i> sp.	Sorgho
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Herbe à marconnet, Herbe à cornette
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron blanc ou Mouron des oiseaux.
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Mousse espagnole, fille de l'air ou barbe de vieillard
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Sumac de l'Ouest
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc, Trèfle rampant
<i>Ulmus americana</i> L.	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Orme du Texas
<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Laurier de Californie, Myrte de l'Oregon
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie, Ortie dioïque
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante, Petite ortie, Ortie grièche
<i>Vaccinium</i> sp.	Myrtille, Airelle
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verveine littorale
<i>Veronica</i> sp.	Véroniques
<i>Vicia faba</i> L.	Fève, Féverole
<i>Vinea</i> spp.	Pervenches
<i>Vitis</i> sp.	Vignes
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringin
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruits

Annexe 2 : liste des végétaux hôtes

<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Catharanthus</i>	Pervenches
<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crète
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Le polygala à feuilles de myrte
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier ou cerisier des oiseaux
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Amandier
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Vinea</i>	Pervenches
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringin


Annexe 3

Délimitation de la zone infectée



Annexe 3

Délimitation de la zone tampon





PREFET DE CORSE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse

Arrêté du 31 juillet 2015 n° 15-0582
définissant une zone délimitée vis-à-vis de *Xylella fastidiosa*
et les mesures de lutte applicables

Le préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/789 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 14 juin 2013 portant nomination de M. Christophe Mirmand en qualité de Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe dont l'introduction et la dissémination sont interdites et un danger sanitaire classé en catégorie 1 par l'arrêté du 15 décembre 2004 ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* peut affecter plus de 200 espèces végétales et causer des dommages majeurs patrimoniaux, économiques et environnementaux ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est transmise et dispersée par des insectes vecteurs ;

Considérant que les analyses du laboratoire national de référence du 22 et du 30 juillet 2015 ont confirmé la présence de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune de Propriano ;

Considérant que les analyses du laboratoire national de référence du 30 juillet 2015 ont conclu que la bactérie présente dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune de Propriano appartient à la sous espèce *multiplex*, totalement différente de la sous espèce *paucis* détectée en Italie ;

Considérant que les cas positifs confirmés ont une origine commune ;

Considérant qu'il convient de fixer les mesures pour prévenir la propagation de *Xylella fastidiosa*, qui peut être due au mouvement de végétaux contaminés ou par les insectes vecteurs ;

Sur la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse,

ARRÊTE

Article 1 - Définition

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- *Xylella fastidiosa*, les isolats européens et non européens de *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ;
- végétaux spécifiés, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 1, c'est-à-dire regroupant les espèces végétales dont il a, jusqu'à présent, été confirmé qu'elles étaient sensibles aux isolats européens et non européens de *Xylella Fastidiosa* ;
- végétaux hôtes, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 2, c'est-à-dire regroupant les espèces végétales sensibles à l'isolat identifié en Corse de *Xylella Fastidiosa*.

Article 2 – Définition de la zone délimitée

La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.

La zone infectée est d'une distance de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l'objet d'analyses ayant révélé une infection par *Xylella fastidiosa*.

La zone tampon s'étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La zone délimitée comprend, dans le cas d'espèce, tout ou partie des communes de Arbellara, Belvedere-Campomoro, Bilia, Casalabriva, Foce, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Loretto-di-Tallano, Moca-Croce, Olmeto, Olmiccia, Petreto-Bicchisano, Propriano, Sartene, Serra-di-Ferro, Sollacaro, Sainte-Lucie-de-Tallano, Santa-Maria-Figaniella, Viggianello.

La délimitation des zones infectées et de la zone tampon figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 3 – Interdiction de plantation dans la zone infectée

Est interdite dans cette zone la plantation de tout végétal hôte.

Article 4 – Mesures d'éradication dans la zone infectée

I - Les mesures d'éradication dans la zone infectée doivent être réalisées sans délai et sous la supervision de la DRAAF.

Elles consistent, dans cet ordre, en :

1. un traitement phytopharmaceutique adapté sur la zone infectée.
2. des prélèvements sur les végétaux symptomatiques, sur les végétaux spécifiés à proximité du végétal infecté, et sur les végétaux ayant une origine commune avec le végétal contaminé.
3. l'arrachage, dans les trois jours suivant la notification administrative, par leurs propriétaires ou détenteurs, de tous les végétaux hôtes, de tout végétal présentant des symptômes douteux, et de tout végétal soupçonné d'être infecté par *Xylella fastidiosa*.

Les matériels utilisés sont désinsectisés et désinfectés.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du motif d'urgence prévu à l'article L251-14 - II du Code rural et de la pêche maritime ; à ce titre, le propriétaire ou détenteur n'est pas mis en demeure de présenter ses observations.

4. la destruction des végétaux concernés par incinération immédiatement après l'abattage, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée.

En cas de transport des végétaux, ces derniers sont maintenus sous bâche.

En période d'interdiction d'emploi du feu, une dérogation est demandée à l'autorité préfectorale.

En fonction du végétal concerné, cette destruction peut se faire sur place par traitement herbicide autorisé pour l'usage concerné et dans le respect des conditions d'usage.

Les produits issus des abattages doivent être détruits immédiatement pour ceux inférieurs à 7 cm de diamètre, et, par dérogation, dans une période n'excédant pas cinq jours depuis le début de l'opération, pour ceux d'un diamètre supérieurs à 7 cm.

En cas d'inexécution des mesures dans le délai prescrit, la DRAAF fait procéder à l'abattage et à la destruction des végétaux concernés aux frais du propriétaire ou du détenteur, conformément à l'article L251-14-II du Code rural et de la pêche maritime.

II – La circulation des personnes et des véhicules entre la zone infectée et la zone tampon est soumise à restriction tant que les mesures d'éradication ne sont pas terminées.

Article 5 – Mesures de surveillance dans la zone délimitée

La DRAAF organise une surveillance des insectes vecteurs et une prospection des végétaux spécifiés selon une grille de 100 mètres par 100 mètres sur l'ensemble de la zone délimitée.

Dans la zone délimitée, tout propriétaire ou exploitant doit faire réaliser à ses frais une prospection visant à la détection de symptômes de *Xylella fastidiosa*.

Article 6 – Mesures applicables à la circulation de végétaux dans la zone délimitée

Dans la zone délimitée, sont interdits toute sortie et tout mouvement de végétaux spécifiés destinés à la plantation, hormis l'application des dispositions de l'article 9 de la décision (UE) 2015/789.

Est admis le transit de végétaux dans la zone délimitée, sans rupture de charge et par un véhicule hermétiquement fermé.

Article 7 – Sanctions en cas d'inexécution du présent arrêté

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

- le fait d'introduire, de détenir sciemment et de transporter la bactérie *Xylella fastidiosa* ;
- le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les présentes dispositions ;

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

- le fait de ne pas mettre en œuvre les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans les délais prescrits.


Article 8 – L'arrêté du 24 juillet 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de *Xylella fastidiosa* et les mesures de lutte applicables est abrogé.

Article 9 – Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, le préfet de Haute Corse, le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de la sécurité publique, le directeur régional des douanes, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la région de gendarmerie et les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Article 10- Le présent arrêté entre en vigueur le 31 juillet 2015.

Fait à Ajaccio, le : 31 JUL. 2015

Le Préfet de Corse,


Christophe MIRMAND

Annexe 1 : liste des végétaux spécifiés

<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Mimosa à longues feuilles, Mimosa chenille
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer</i> sp.	Erables
<i>Aesculus</i> sp.	Marronniers, Paviers
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géant
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Arbre à soie
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aulne blanc
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Alternanthera
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante fausse blette
<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	Franserie lampourde
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koelne	Vigne vierge
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	Vigne vierge
<i>Artemisia douglasiana</i> Hook.	Armoise
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>heterophylla</i> (H.M. Hall & Clements) Jepson	Armoise commune
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Sénéçon en arbre
<i>Baccharis pilularis</i> DC.	Baccharis
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.)	Baccharis
<i>Bidens pilosa</i> L.	Sornet, Herbe à aiguilles, Bident hérissé
<i>Brachiaria decumbens</i> (Stapf)	<i>Brachiaria decumbens</i>
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.	<i>Brachiaria plantaginea</i>
<i>Brassica</i> sp.	<i>Brassica</i> (navet, rutabaga, moutarde,...)
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines
<i>Callicarpa americana</i> L.	Callicarpe d'Amérique, Arbre aux bonbons
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse à pasteur
<i>Carex</i> sp.	Carex, Lâches
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Pacanier (noix de Pécan)
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Cassia tora</i>
<i>Catharanthus</i> sp.	Pervenches
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Célastre orbiculaire ou bourreau des arbres
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoutier de Virginie
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Cram-cram
<i>Cercis canadensis</i> L.	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Cercis occidentalis</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Chamaecrista fasciculata</i>
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa
<i>Chionanthus</i> sp.	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Chitalpa tashkinensis</i> T. S. Elias & Wisura	Chitalpa de Tashkent
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Citrus</i> sp.	Citrus

<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crête
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Coelorachis cylindrica</i>
<i>Coffea</i> sp.	Caféier
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commeline
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande Ciguë
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette / Vergerolle / Érigéron du Canada
<i>Cornus florida</i> L.	Cornouiller à fleurs, Cornouiller de Floride, Bois de chien
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne de cerf didyme
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet robuste
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais
<i>Datura wrightii</i> Regel	Datura
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Digitaire, Herbe à blé, Herbe fine
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman	Digitaire
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine
<i>Duranta erecta</i> L.	Vanillier de Cayenne
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Epazote, Fausse ambrosie
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Panic des marais, Panic pied-de-coq, Pied-de-coq
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	Encelia
<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.	Eriochloé contractée, Prairie cupgrass
<i>Erodium</i> sp.	Bees de grue, Erodium
<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto	Escallonia
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gommier de Camaldoli, Gommier des rivières
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus commun, Gommier bleu
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims	Cerisier des Antilles, Myrte d'Australie
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i>
<i>Euphorbia terracina</i> L.	
<i>Fagus crenata</i> Blume	Hêtre du Japon
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier comestible ou Figuier commun
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc Frêne
<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn.	Frêne californien
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsia de Magellan
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	Genêt de Montpellier
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées, Géranium découpé
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol
<i>Hemerocallis</i> spp.	Hémérocalles, Lys d'un jour
<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.	Houx de Californie

<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker	Lanterne japonaise
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Althéa, Mauve en arbre
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hydrangea paniculé
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton	Aiton
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Volubilis
<i>Iva amara</i> L.	Iva
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Flamboyant bleu
<i>Juglans</i> spp.	Noyers
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Genévrier Ashe
<i>Koeberlinia bipinnata</i> Franch.	Savonnier
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage, laitue scariole
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes
<i>Lavandula dentata</i>	Lavande dentée
<i>Ligustrum lucidum</i> L.	Troène de Chine, Troène à feuilles brillantes
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene	Verveine nodiflore
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais
<i>Lonicera japonica</i> (L.) Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie (Jussie) à grandes fleurs, Grande Jussie
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	Lupin buissonnant
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia (Magnolier) à grandes fleurs, laurier-tulipier
<i>Malva</i> sp.	Mauves
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube blanc, Marrube Commun
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne à fruits nombreux
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne, Alfalfa
<i>Melilotus</i> sp.	Mélilots
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale
<i>Metrosideros</i> sp.	Metrosideros, Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Mauve de Caroline
<i>Montia linearis</i> (Hook.) Greene	Montie linéaire
<i>Morus</i> sp.	Mûriers
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nandina domestica</i> Murray	Bambou sacré
<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	Neptunia jaune
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabac glauque, Tabac arborescent
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Origanum majorana</i> L.	Marjolaine, Origan des jardins
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis, Millet bâtard
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmier du Sénégal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Faux dattier, Dattier nain, Dattier du Mékong

<i>Pinus taeda</i> L.	Pin à encens
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé, Plantain étroit
<i>Platanus</i> sp.	Platanes
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Géri tout
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Polygonum lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oscille
<i>Polygonum persicaria</i> Gray	Renouée persicaire
<i>Populus fremontii</i> S. Watson	Peuplier de Fremont
<i>Portulaca</i> sp.	Pourpiers
<i>Prunus</i> sp.	Prunus
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Nashi
<i>Quercus</i> sp.	Chênes
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante, Bouton d'or
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray	Sumac de l'Ouest
<i>Rosa californica</i> Cham. & Schldl.	Rosier de Californie
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Rubus</i> sp.	Ronces
<i>Rumex crispus</i> L.	Oscille crépue
<i>Salix</i> sp.	Saules
<i>Salsola tragus</i> L.	Soude roulante
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge mellifère
<i>Sambucus</i> sp.	Sureaux
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier
<i>Schinus molle</i> L.	Faux-poivrier
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sénéçon commun
<i>Setaria magna</i> Griseb.	<i>Setaria magna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon-Marie
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C. K. Schneid.	Joboba
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Roquette jaune
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Brède morelle, Morelle d'Amérique
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Morelle jaune, Morelle à feuilles de châtaf
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Sonchus</i> sp.	Laiterons
<i>Sorghum</i> sp.	Sorgho
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Herbe à marconnet, Herbe à cornette
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron blanc ou Mouron des oiseaux.
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Mousse espagnole, fille de l'air ou barbe de vicillard
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Sumac de l'Ouest
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc, Trèfle rampant


<i>Ulmus americana</i> L.	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Orme du Texas
<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Laurier de Californie, Myrte de l'Oregon
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie, Ortie dioïque
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante, Petite ortie, Ortie grièche
<i>Vaccinium</i> sp.	Myrtille, Airelle
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verveine littorale
<i>Veronica</i> sp.	Véroniques
<i>Vicia faba</i> L.	Fève, Féverole
<i>Vinea</i> spp.	Pervenches
<i>Vitis</i> sp.	Vignes
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringin
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruits

Annexe 2 : liste des végétaux hôtes de *Xylella fastidiosa* sous espèce multiplex

<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge
<i>Acer platanoides</i>	Érable plane
<i>Acer griseum</i>	Érable à écorce de papier
<i>Alnus rhombifolia</i>	Aulne blanc
<i>Ambrosia trifida</i>	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis cordata</i>	Vigne vierge
<i>Carya illinoensis</i>	Pacanier (noix de pécan)
<i>Celtis occidentalis</i>	Micocoulier de Virginie
<i>Cercis canadensis</i>	Gaïnier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i>	Cercis occidentalis
<i>Chionanthus sp.</i>	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Citrus sp.</i>	Citrus
<i>Encelia farinosa</i>	Encelia
<i>Fraxinus americana</i>	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc frêne
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Févier d'Amérique
<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol (des jardins)
<i>Iva annua</i>	Iva
<i>Koeleruteria bipinnata</i>	Savonnier de chine
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lilas des Indes
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipier de Virginie
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Olea europea</i>	Olivier
<i>Platanus occidentalis</i>	Platane
<i>Polygala myrtifolia L.</i>	Polygale à feuilles de myrte
<i>Prunus persica</i>	Pêcher
<i>Prunus dulcis, Prunus amygdalus</i>	Amandier
<i>Prunus domestica</i>	Prunier
<i>Prunus cerasifera</i>	Prunier cerise
<i>Quercus coccinea</i>	Chêne beige
<i>Quercus falcata</i>	Chêne rouge du sud
<i>Quercus laevis</i>	Chêne turque
<i>Quercus macrocarpa</i>	Chêne à gros fruits
<i>Quercus nigra</i>	Chêne noir
<i>Quercus palustris</i>	Chêne des marais
<i>Quercus phellos</i>	Chêne à feuilles de saule
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique
<i>Quercus shumardii</i>	Chêne de Schumard
<i>Ratibida columnaris</i>	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rubus sp.</i>	Ronces
<i>Salvia mellifera</i>	Sauge mellifère
<i>Sapindus saponaria</i>	Savonnier
<i>Solidago virgaurea</i>	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique

<i>Ulmus crassifolia</i>	Orme du Texas
<i>Vaccinium sp.</i>	Myrtille, Airelle
<i>Vinca sp.</i>	Pervenches
<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruit

Annexe 3 : Cartographie des zones infectées et de la zone tampon





PREFET DE CORSE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse

Arrêté du 1^{er} août 2015 n° 15-0583
définissant une zone délimitée vis-à-vis de *Xylella fastidiosa*
et les mesures de lutte applicables

Le Préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,

Vu la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/789 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 14 juin 2013 portant nomination de M. Christophe Mirmand en qualité de Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autre objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe dont l'introduction et la dissémination sont interdites et un danger sanitaire classé en catégorie 1 par l'arrêté du 15 décembre 2004 ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* peut affecter plus de 200 espèces végétales et causer des dommages majeurs patrimoniaux, économiques et environnementaux ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est transmise et dispersée par des insectes vecteurs ;

Considérant que les analyses du laboratoire national de référence du 31 juillet 2015 ont confirmé la présence de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune d'Albitreccia, Bastellicaccia, Peri, Porticcio et Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio ;

Considérant que l'identification de la sous espèce et de la souche de la bactérie *Xylella fastidiosa* présente dans le département de la Corse-du-Sud sur les communes de Albitreccia, Bastellicaccia, Peri, Porticcio et Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio n'est pas connue à la date d'effet de l'arrêté, même si la bactérie présente sur la commune de Propriano a été identifiée le 30 juillet dernier comme appartenant à la sous-espèce *multiplex* ;

Considérant qu'il convient de fixer les mesures pour prévenir la propagation de la bactérie *Xylella fastidiosa*, qui peut être due au mouvement de végétaux contaminés ou aux insectes vecteurs ;

Sur la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse,

ARRÊTE

Article 1 - Définition

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- *Xylella fastidiosa*, les isolats européens et non européens de *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ;
- végétaux spécifiés, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 1, c'est-à-dire regroupant les espèces végétales dont il a, jusqu'à présent, été confirmé qu'elles étaient sensibles aux isolats européens et non européens de *Xylella Fastidiosa* ;
- végétaux hôtes, tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 2, c'est-à-dire regroupant les espèces végétales sensibles aux isolats européens de *Xylella fastidiosa*, identifiés dans les Pouilles (Italie) et en France (Corse – en caractère gras).

Article 2 – Définition de la zone délimitée

La zone délimitée se compose d'une zone infectée et d'une zone tampon.

La zone tampon s'étend sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée.

La zone infectée est d'une distance de 100 mètres autour des végétaux qui ont fait l'objet d'analyses ayant révélé une infection par *Xylella Fastidiosa*.

La zone délimitée comprend tout ou partie des communes de Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Appieto, Bastelica, Bastelicaccia, calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Casaglione, Cauro, Cognocoli-Monticchi, Conca, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Guarguale, Lecci, Lopigna, Ocana, Peri, Pietroselle, Pila-Canale, porto-Vecchio, Salice, San-Gavino-Di-Carbini, Sant'Andrea-D'orcino, Sari-D'orcino, Sarrola-Carpocino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Tolla, Ucciani, Valle-di-Mezzanaa, Vero et Zonza.

La délimitation des zones infectées et des zones tampons est annexée au présent arrêté.

Article 3 – Interdiction de plantation dans la zone infectée

Est interdite dans cette zone la plantation de tout végétal hôte.

Article 4 – Mesures d'éradication dans la zone infectée

1 - Les mesures d'éradication dans la zone infectée doivent être réalisées sans délai et sous la supervision de la DRAAF. Elles consistent, dans cet ordre, en :

1. Un traitement phytopharmaceutique adapté sur la zone infectée.
2. Des prélèvements sur les végétaux symptomatiques, sur les végétaux spécifiés à proximité du végétal infecté, et sur les végétaux ayant une origine commune avec le végétal contaminé.
3. La destruction dans les cinq jours suivant la notification administrative, par leurs propriétaires ou détenteurs, de tous les végétaux spécifiés et de tout végétal présentant des symptômes douteux.

Dans l'attente de la confirmation de la sous-espèce de la bactérie *Xylella Fastidiosa* par le laboratoire national de référence, et tenant compte de la découverte récente à Propriano de la sous-espèce *mutliple*, les végétaux hôtes définis en gras à l'annexe 2, et correspondant aux végétaux sensibles à cette sous-espèce, sont ciblés prioritairement.

Les matériels utilisés sont désinsectisés et désinfectés.

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du motif d'urgence prévu à l'article L251-14 - II du Code rural et de la pêche maritime ; à ce titre, le propriétaire ou détenteur n'est pas mis en demeure de présenter ses observations.

4. Les végétaux doivent être détruits par incinération immédiatement après l'abattage, sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée.

En cas de transport des végétaux, ces derniers sont maintenus sous bâche.

En période d'interdiction d'emploi du feu, une dérogation est demandée à l'autorité préfectorale.

En fonction du végétal concerné, cette destruction peut se faire sur place par traitement herbicide autorisé pour l'usage concerné et dans le respect des conditions d'usage.

Les produits issus des abattages doivent être détruits immédiatement pour ceux inférieurs à 7 cm de diamètre, et, par dérogation, dans une période n'excédant pas, depuis le début de l'opération, sept jours, ceux d'un diamètre supérieurs à 7 cm.

En cas d'inexécution dans le délai prescrit, la DRAAF fait procéder à l'abattage et à la destruction des végétaux concernés, aux frais du propriétaire ou du détenteur, conformément à l'article L251-14 – II du Code rural et de la pêche maritime.

II – La circulation des personnes et des véhicules entre la zone infectée et la zone tampon est soumise à restriction tant que les mesures d'éradication ne sont pas terminées.

Article 5 – Mesures de surveillance dans la zone délimitée

La DRAAF organise une surveillance des insectes vecteurs et une prospection des végétaux spécifiés selon une grille de 100 mètres par 100 mètres sur l'ensemble de la zone délimitée.

Dans la zone délimitée, tout propriétaire ou exploitant doit faire réaliser à ses frais une prospection visant à la détection de symptômes de *Xylella fastidiosa*.

Article 6 – Mesures applicables à la circulation de végétaux dans la zone délimitée

Dans la zone délimitée, sont interdits toute sortie et tout mouvement de végétaux spécifiés destinés à la plantation, hormis l'application des dispositions de l'article 9 de la décision (UE) 2015/789.

Est admis le transit de végétaux dans la zone délimitée, sans rupture de charge et par un véhicule hermétiquement fermé.

Article 7 – Sanctions en cas d'inexécution du présent arrêté

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

- le fait d'introduire, de détenir sciemment et de transporter la bactérie *Xylella fastidiosa* ;
- le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les présentes dispositions ;

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

- le fait de ne pas mettre en œuvre les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans les délais prescrits.

Article 9 – Entrée en vigueur


Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} août 2015.

Article 8 – Exécution

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, le préfet de Haute Corse, le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de la sécurité publique, le directeur régional des douanes, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la région de gendarmerie et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le : 1 AOUT 2015

Le Préfet de Corse,


Christophe MIRMAND

Annexe 1 : liste des végétaux spécifiés

<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Mimosa à longues feuilles, Mimosa chenille
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer</i> sp.	Erables
<i>Aesculus</i> sp.	Marronniers, Paviers
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géant
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Arbre à soie
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aulne blanc
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Alternanthera
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante fausse blette
<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	Franserie lampourde
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koelme	Vigne vierge
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	Vigne vierge
<i>Artemisia douglasiana</i> Hook.	Armoise
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>heterophylla</i> (H.M. Hall & Clements) Jepson	Armoise commune
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Séneçon en arbre
<i>Baccharis pilularis</i> DC.	Baccharis
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.)	Baccharis
<i>Bidens pilosa</i> L.	Sornet, Herbe à aiguilles, Bident hérissé
<i>Brachiaria decumbens</i> (Stapf)	<i>Brachiaria decumbens</i>
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.	<i>Brachiaria plantaginea</i>
<i>Brassica</i> sp.	<i>Brassica</i> (navet, rutabaga, moutarde,...)
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines
<i>Callicarpa americana</i> L.	Callicarpe d'Amérique, Arbre aux bonbons
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse à pasteur
<i>Carex</i> sp.	Carex, Laïches
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Pacancier (noix de Pécan)
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Cassia tora</i>
<i>Catharanthus</i> sp.	Pervenches
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Célastre orbiculaire ou bourreau des arbres
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Cram-cram
<i>Cercis canadensis</i> L.	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Cercis occidentalis</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Chamaecrista fasciculata</i>
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa
<i>Chionanthus</i> sp.	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Chitalpa tashkinensis</i> T. S. Elias & Wisura	Chitalpa de Tashkent
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Citrus</i> sp.	Citrus

<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crête
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Michx.) Nash	<i>Coelorachis cylindrica</i>
<i>Coffea</i> sp.	Caféier
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commeline
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande Ciguë
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette / Vergerolle / Érigéron du Canada
<i>Cornus florida</i> L.	Cornouiller à fleurs, Cornouiller de Floride, Bois de chien
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne de cerf didyme
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet robuste
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais
<i>Datura wrightii</i> Regel	Datura
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Digitaire, Herbe à blé, Herbe fine
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman	Digitaire
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine
<i>Duranta erecta</i> L.	Vanillier de Cayenne
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clematis	Epazote, Fausse ambrosie
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Panic des marais, Panic pied-de-coq, Pied-de-coq
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	Encelia
<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.	Eriochloé contractée, Prairie cupgrass
<i>Erodium</i> sp.	Bees de grue, Erodium
<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto	Escallonia
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gommier de Camaldoli, Gommier des rivières
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus commun, Gommier bleu
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims	Cerisier des Antilles, Myrte d'Australie
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i>
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine
<i>Fagus crenata</i> Blume	Hêtre du Japon
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier comestible ou Figuiers commun
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc Frêne
<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn.	Frêne californien
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsia de Magellan
<i>Genista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	Genêt de Montpellier
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées, Géranium découpé
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol
<i>Hemerocallis</i> spp.	Hémérocailles, Lys d'un jour
<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.	Houx de Californie

<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker	Lanterne japonaise
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Althéa, Mauve en arbre
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hydrangea paniculé
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton	Aiton
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Volubilis
<i>Iva annua</i> L.	Iva
<i>Jacaranda minosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Flamboyant bleu
<i>Juglans</i> spp.	Noyers
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Genévrier Ashe
<i>Koeleria bipinnata</i> Franch.	Savonnier
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage, laitue scariole
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes
<i>Lavandula dentata</i>	Lavande dentée
<i>Ligustrum lucidum</i> L.	Troène de Chine, Troène à feuilles brillantes
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene	Verveine nodiflore
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais
<i>Lonicera japonica</i> (L.) Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie (Jussie) à grandes fleurs, Grande Jussie
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	Lupin buissonnant
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia (Magnolier) à grandes fleurs, laurier-tulipier
<i>Malva</i> sp	Mauves
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube blanc, Marrube Commun
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne à fruits nombreux
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne, Alfalfa
<i>Melilotus</i> sp.	Mélicots
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale
<i>Metrosideros</i> sp.	Metrosideros, Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Mauve de Caroline
<i>Montia linearis</i> (Hook.) Greene	Montie linéaire
<i>Morus</i> sp.	Mûriers
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nandina domestica</i> Murray	Bambou sacré
<i>Neptunia lutea</i> (Leavenw.) Benth.	Neptunia jaune
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabac glauque, Tabac arborescent
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Origanum majorana</i> L.	Marjolaine, Origan des jardins
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis, Millet bâtard
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmier du Sénégal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Faux dattier, Dattier nain, Dattier du Mékong

<i>Pinus taeda</i> L.	Pin à encens
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé, Plantain étroit
<i>Platanus</i> sp.	Platanes
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Géri tout
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Polygonum lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Polygonum persicaria</i> Gray	Renouée persicaire
<i>Populus fremontii</i> S. Watson	Peuplier de Fremont
<i>Portulaca</i> sp.	Pourpiers
<i>Prunus</i> sp.	Prunus
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Nashi
<i>Quercus</i> sp.	Chênes
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante, Bouton d'or
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray	Sumac de l'Ouest
<i>Rosa californica</i> Cham. & Schldl.	Rosier de Californie
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Rubus</i> sp.	Ronces
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue
<i>Salix</i> sp.	Sauces
<i>Salsola tragus</i> L.	Soude roulante
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge mellifère
<i>Sambucus</i> sp.	Sureaux
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier
<i>Schinus molle</i> L.	Faux-poivrier
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun
<i>Setaria magna</i> Griseb.	<i>Setaria magna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon-Marie
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C. K. Schneid.	Jojoba
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Roquette jaune
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Brède morelle, Morelle d'Amérique
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Morelle jaune, Morelle à feuilles de châtaf
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Sonchus</i> sp.	Laiterons
<i>Sorghum</i> sp.	Sorgho
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Herbe à marconnet, Herbe à comette
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron blanc ou Mouron des oiseaux.
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Mousse espagnole, fille de l'air ou barbe de vicillard
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Sumac de l'Ouest
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc, Trèfle rampant

<i>Ulmus americana</i> L.	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Orme du Texas
<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Laurier de Californie, Myrte de l'Oregon
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie, Ortie dioïque
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante, Petite ortie, Ortie grèche
<i>Vaccinium</i> sp.	Myrtille, Airelle
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verveine littorale
<i>Veronica</i> sp.	Véroniques
<i>Vicia faba</i> L.	Fève, Féverole
<i>Vinca</i> spp.	Pervenches
<i>Vitis</i> sp.	Vignes
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringin
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruits


Annexe 2 : liste des végétaux hôtes

<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer rubrum</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Acer griseum</i>	Érable rouge Érable plane Érable à écorce de papier
<i>Alnus rombifolia</i>	Aulne blanc
<i>Ambrosia trifida</i>	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis cordata</i>	Vigne vierge
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Carya illinoensis</i>	Pacanier (noix de pécan)
<i>Catharanthus sp.</i>	Pervenches
<i>Celtis occidentalis</i>	Micocoulier de Virginie
<i>Cercis canadensis</i>	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i>	Cercis occidentalis
<i>Chionanthus sp.</i>	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crête
<i>Citrus sp.</i>	Citrus
<i>Encelia farinosa</i>	Encelia
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine
<i>Fraxinus americana</i>	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc frêne
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol (des jardins)
<i>Iva annua</i>	Iva
<i>Koeleruteria bipinnata</i>	Savonnier de chine
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lilas des Indes
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipier de Virginie
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Olea europea</i>	Olivier
<i>Platanus occidentalis</i>	Platane
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Prunus avium</i> <i>Prunus persica</i> <i>Prunus dulcis</i> , <i>Prunus amygdalus</i> <i>Prunus domestica</i> <i>Prunus cerasifera</i>	Merisier ou cerisier des oiseaux Pêcher Amandier Prunier Prunier cerise
<i>Quercus coccinea</i> <i>Quercus falcata</i> <i>Quercus laevis</i> <i>Quercus macrocarpa</i> <i>Quercus nigra</i> <i>Quercus palustris</i>	Chêne belge Chêne rouge du sud Chêne turc Chêne à gros fruits Chêne noir Chêne des marais

<i>Quercus phellos</i>	Chêne à feuilles de saule
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique
<i>Quercus shumardii</i>	Chêne de Schumard
<i>Ratibida columnaris</i>	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus L.</i>	Nerprun alaterné
<i>Rosmarinus officinalis L.</i>	Romarin
<i>Rubus sp.</i>	Ronces
<i>Salvia mellifera</i>	Sauge mellifère
<i>Sapindus saponaria</i>	Savonnier
<i>Solidago virgaurea</i>	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Spartium junceum L.</i>	Genêt d'Espagne
<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i>	Orme du Texas
<i>Vaccinium sp.</i>	Myrtille, Airelle
<i>Vinca sp.</i>	Pervenches
<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruit
<i>Westringia glabra L.</i>	Violette de Westringin
<i>Xanthium spinosum L.</i>	Lampourde épineuse

Annexe 3 : cartographie des zones infectées et de la zone tampon

Sainte Lucie de Porto-vecchio



Albitreccia, Bastelicaccia, Peri et Porticcio

