



RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA REGION CORSE

Spécial n°30 du 11 août 2015

SOMMAIRE

15-0620	définissant les mesures de lutte applicables contre de <i>Xylella Fastidiosa</i>
---------	--



PREFET DE CORSE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse

Arrêté du 10 août 2015 n° 15-0620
définissant les mesures de lutte applicables contre *Xylella fastidiosa*

*Le Préfet de Corse,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du mérite,*

Vu la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/789 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 14 juin 2013 portant nomination de M. Christophe Mirmand en qualité de Préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoires ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégories pour les espèces végétales ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est un organisme nuisible réglementé de quarantaine en Europe dont l'introduction et la dissémination sont interdites et un danger sanitaire classé en catégorie 1 par l'arrêté du 15 décembre 2004 ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* peut affecter plus de 200 espèces végétales et causer des dommages majeurs patrimoniaux, économiques et environnementaux ;

Considérant que la bactérie *Xylella fastidiosa* est transmise et dispersée par des insectes vecteurs ;

Considérant que les analyses du laboratoire national de référence ont conclu que la bactérie *Xylella fastidiosa* présente dans le département de la Corse-du-Sud sur certaines communes appartient à la sous-espèce *multiplex*, différente de la sous-espèce *pauca* à laquelle est rattachée la souche Codiro identifiée en Italie, tandis que l'identification de la sous-espèce et de la souche de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans d'autres communes n'est pas encore connue à la date d'effet de l'arrêté ;

Considérant qu'il convient de fixer les mesures pour prévenir la propagation de la bactérie *Xylella fastidiosa*, qui peut être due au mouvement de végétaux contaminés ou aux insectes vecteurs ;

Sur la proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse,

ARRÊTE

Article 1 - Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- *Xylella fastidiosa*, les isolats européens et non européens de *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ;
- végétaux spécifiés, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 1, c'est-à-dire regroupant les espèces végétales dont il a, jusqu'à présent, été confirmé qu'elles étaient sensibles aux isolats européens et non européens de *Xylella Fastidiosa* ;
- végétaux hôtes, tous les végétaux spécifiés appartenant aux genres ou aux espèces énumérés à l'annexe 2, regroupant les espèces végétales sensibles aux isolats européens de *Xylella fastidiosa* identifiés en Corse ;
- zone délimitée, zone comprenant une zone infectée et une zone tampon
- zone tampon, s'étendant sur au moins 10 kilomètres autour de la zone infectée
- zone infectée, d'une distance de 100 mètres autour des végétaux infectés par *Xylella fastidiosa*.

Article 2 – Définition d'une zone délimitée autour des végétaux infectés par *Xylella fastidiosa*

La délimitation des zones infectées et des zones tampons est mise à jour sur le site internet de l'Etat en Corse (www.corse.gouv.fr).

Article 3 – Interdiction de plantation dans la zone infectée

Est interdite dans cette zone la plantation de tout végétal hôte.

Article 4 – Mesures d'éradication dans la zone infectée

I - Les mesures d'éradication dans la zone infectée sont réalisées sous la supervision de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Corse et consistent, dans cet ordre, en :

1. La réalisation d'un traitement phytopharmaceutique insecticide adapté sur la zone infectée.
2. Des prélèvements sur les végétaux présentant des symptômes suspects, sur les végétaux spécifiés à proximité du végétal infecté, comprenant au minimum des prélèvements sur la totalité des espèces de végétaux spécifiés présents dans les 15 mètres autour du végétal infecté et sur les végétaux du genre *Polygala* présents dans les 100 mètres autour du végétal infecté, ainsi que sur les végétaux ayant une origine commune avec le végétal infecté.
3. L'arrachage, dans les cinq jours suivant notification administrative individuelle, par leurs propriétaires ou détenteurs :
 - des végétaux infectés ;
 - des végétaux du genre *Polygala* ;
 - de tout autre végétal présentant des symptômes douteux.
4. L'arrachage, dans les cinq jours suivant une nouvelle notification administrative individuelle, par leurs propriétaires ou détenteurs, des végétaux hôtes sans symptômes.
5. L'incinération des végétaux abattus.

Cette opération se déroule sur place ou à un endroit proche désigné à cet effet dans la zone infectée.

Elle a lieu immédiatement après l'abattage pour tout rémanent inférieur à 7 cm de diamètre, et dans une période n'excédant pas cinq jours après l'abattage pour ceux d'un diamètre supérieur à 7 cm.

En cas de transport des végétaux, ces derniers sont maintenus sous bâche.

En période d'interdiction d'emploi du feu, une dérogation est demandée à l'autorité préfectorale, ou un traitement herbicide autorisé pour l'usage concerné est appliquée sur les végétaux concernés.

II - Les matériels utilisés sont désinsectisés et désinfectés.

III - Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du motif d'urgence prévu à l'article L251-14 - II du Code rural et de la pêche maritime.

IV - En cas d'inexécution dans le délai prescrit, la DRAAF fait procéder à l'abattage et à la destruction des végétaux concernés, aux frais du propriétaire ou du détenteur, conformément à l'article L251-14 - II du Code rural et de la pêche maritime.

V - La circulation des personnes et des véhicules entre la zone infectée et la zone tampon est soumise à restriction tant que les mesures d'éradication ne sont pas terminées.

Article 5 – Mesures de surveillance dans la zone délimitée

La DRAAF organise une surveillance des insectes vecteurs et une prospection des végétaux spécifiés selon une grille de 100 mètres par 100 mètres sur l'ensemble de la zone délimitée.

Dans la zone délimitée, tout propriétaire ou exploitant fait réaliser à ses frais une prospection visant à la détection de symptômes de *Xylella fastidiosa* par la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) de Corse, organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal.

Article 6 – Mesures applicables à la circulation de végétaux dans la zone délimitée

Dans la zone délimitée, sont interdits toute sortie et tout mouvement de végétaux spécifiés destinés à la plantation, hormis l'application des dispositions de l'article 9 de la décision (UE) 2015/789.

Est admis le transit de végétaux dans la zone délimitée, sans rupture de charge et par un véhicule hermétiquement fermé.

Article 7 – Sanctions en cas d'inexécution du présent arrêté

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

- le fait d'introduire, de détenir sciemment et de transporter la bactérie *Xylella fastidiosa* ;
- le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les présentes dispositions ;

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

- le fait de ne pas mettre en œuvre les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de la bactérie *Xylella fastidiosa* dans les délais prescrits.

Article 8 – Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les arrêtés n°15-0582 du 31 juillet 2015 et n°15-0583 du 1^{er} août 2015 définissant une zone délimitée vis-à-vis de *Xylella fastidiosa* et les mesures de lutte applicables sont abrogés.


Dans un délai de cinq jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de Corse-du-Sud notifie aux propriétaires et détenteurs concernés par les arrêtés du 31 juillet 2015 et du 1^{er} août 2015 susmentionnés les obligations d'arrachage de végétaux qui leur incombent, conformément aux prescriptions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8 – Exécution

Le préfet de Corse, préfet de Corse du Sud, le préfet de Haute Corse, le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de la sécurité publique, le directeur régional des douanes, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant de la région de gendarmerie et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse.

Fait à Ajaccio, le : **10 AOUT 2015**

Pour le Préfet de Corse,
et par délégation,
le Secrétaire général pour les affaires de Corse


François LALANNE

Annexe 1 : liste des végétaux spécifiés

<i>Acacia longifolia</i> (Andrews) Willd.	Mimosa à longues feuilles, Mimosa chenille
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) H. L. Wendl.	Mimosa bleuâtre / Mimosa à feuilles d'eucalyptus
<i>Acer</i> sp.	Erables
<i>Aesculus</i> sp.	Marronniers, Paviers
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géant
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Arbre à soie
<i>Alnus rhombifolia</i> Nutt.	Aulne blanc
<i>Alternanthera tenella</i> Colla	Alternanthera
<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Amarante fausse blette
<i>Ambrosia acanthicarpa</i> Hook.	Franserie lampourde
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambroisie à feuilles d'armoise
<i>Ambrosia trifida</i> L.	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne	Vigne vierge
<i>Ampelopsis cordata</i> Michx.	Vigne vierge
<i>Artemisia douglasiana</i> Hook.	Armoise
<i>Artemisia vulgaris</i> var. <i>heterophylla</i> (H.M. Hall & Clements) Jepson	Armoise commune
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Séneçon en arbre
<i>Baccharis pilularis</i> DC.	Baccharis
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.)	Baccharis
<i>Bidens pilosa</i> L.	Sornet, Herbe à aiguilles, Bident hérissé
<i>Brachiaria decumbens</i> (Stapf)	<i>Brachiaria decumbens</i>
<i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc.	<i>Brachiaria plantaginea</i>
<i>Brassica</i> sp.	<i>Brassica</i> (navet, rutabaga, moutarde, ...)
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines
<i>Callicarpa americana</i> L.	Callicorpe d'Amérique, Arbre aux bonbons
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse à pasteur
<i>Carex</i> sp.	Carex, Lâches
<i>Carya illinoensis</i> (Wangenh.) K. Koch	Pacanier (noix de Pécan)
<i>Cassia tora</i> (L.) Roxb.	<i>Cassia tora</i>
<i>Catharanthus</i> sp.	Pervenches
<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Célastre orbiculaire ou bourreau des arbres
<i>Celtis occidentalis</i> L.	Micocoulier de Virginie
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	Crami-cram
<i>Cercis canadensis</i> L.	Galnier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i> Torr.	<i>Cercis occidentalis</i>
<i>Chamaecrista fasciculata</i> (Michx.) Greene	<i>Chamaecrista fasciculata</i>
<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.	Quinoa
<i>Chionanthus</i> sp.	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Chitalpa tashkentensis</i> T. S. Elias & Wisura	Chitalpa de Tashkent
<i>Asparagus acutifolius</i> L.	Asperge sauvage ou asperge à feuilles aiguës
<i>Citrus</i> sp.	Citrus

<i>Cistus creticus</i> L.	Cyste de Crête
<i>Coelorachis cylindrica</i> (Afichx.) Nash	<i>Coelorachis cylindrica</i>
<i>Coffea</i> sp.	Caféier
<i>Commelina benghalensis</i> L.	Commeline
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande Ciguë
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette / Vergerolle / Érigéron du Canada
<i>Cornus florida</i> L.	Cornouiller à fleurs, Cornouiller de Floride, Bois de chien
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne de cerf didyme
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied de poule
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet robuste
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Souchet comestible
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais
<i>Datura wrightii</i> Regel	Datura
<i>Digitaria horizontalis</i> Willd.	Digitaire, Herbe à blé, Herbe fine
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Ekman	Digitaire
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine
<i>Duranta erecta</i> L.	Vanillier de Cayenne
<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clematis	Epazote, Fausse ambroisie
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Panic des marais, Panic pied-de-coq, Pied-de-coq
<i>Encelia farinosa</i> A. Gray ex Torr.	Encelia
<i>Eriochloa contracta</i> Hitchc.	Eriochloa contractée, Prairie cupgrass
<i>Erodium</i> sp.	Becs de grue, Erodium
<i>Escallonia montevidensis</i> Link & Otto	Escallonia
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Gommier de Camaldoli, Gommier des rivières
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalyptus commun, Gommier bleu
<i>Eugenia myrtifolia</i> Sims	Cerisier des Antilles, Myrte d'Australie
<i>Euphorbia hirta</i> L.	<i>Euphorbia hirta</i>
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine
<i>Fagus crenata</i> Blume	Hêtre du Japon
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier comestible ou Figuiers commun
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois
<i>Fraxinus americana</i> L.	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc Frêne
<i>Fraxinus dipetala</i> Hook. & Arn.	Frêne californien
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Fuchsia de Magellan
<i>Gentista monspessulana</i> (L.) L. A. S. Johnson	Genêt de Montpellier
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium à feuilles découpées, Géranium découpé
<i>Ginkgo biloba</i> L.	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier d'Amérique
<i>Grevillea juniperina</i> L.	Grévilier à feuilles de genévrier
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant
<i>Helianthus annuus</i> L.	Tournesol
<i>Hemerocallis</i> spp.	Hémérocalles, Lys d'un jour
<i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) M. Roem.	Houx de Californie

<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Masters) J.D. Hooker	Lanterne japonaise
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Althéa, Mauve en arbre
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats
<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold	Hydrangea paniculé
<i>Ilex vomitoria</i> Sol. ex Aiton	Aiton
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Volubilis
<i>Iva annua</i> L.	Iva
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Jacaranda, Flamboyant bleu
<i>Juglans</i> spp.	Noyers
<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Genévrier Ashe
<i>Koeleria bipinnata</i> Franch.	Savonnier
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue sauvage, laitue scariote
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lilas des Indes
<i>Lavandula dentata</i>	Lavande dentée
<i>Ligustrum lucidum</i> L.	Troène de Chine, Troène à feuilles brillantes
<i>Lippia nodiflora</i> (L.) Greene	Verveine nodiflore
<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipier de Virginie
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass anglais
<i>Lonicera japonica</i> (L.) Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Ludwigie (Jussie) à grandes fleurs, Grande Jussie
<i>Lupinus aridorum</i> McFarlin ex Beckner	Lupin buissonnant
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia (Magnolier) à grandes fleurs, laurier-tulipier
<i>Malva</i> sp.	Mauves
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube blanc, Marrube commun
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne à fruits nombreux
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne, Alfalfa
<i>Melilotus</i> sp.	Mélilots
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale
<i>Metrosideros</i> sp.	Metrosideros, Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Mauve de Caroline
<i>Montia linearis</i> (Hook.) Greene	Montie linéaire
<i>Morus</i> sp.	Mûriers
<i>Myrtus communis</i> L.	Myrte commun
<i>Nandina domestica</i> Murray	Bambou sacré
<i>Neptunia lutea</i> (Leavens) Benth.	Neptunia jaune
<i>Nerium oleander</i> L.	Laurier rose
<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabac glauque, Tabac arborescent
<i>Olea europaea</i> L.	Olivier
<i>Origanum majorana</i> L.	Marjolaine, Origan des jardins
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dallis, Millet bâtard
<i>Persea americana</i> Mill.	Avocatier
<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.	Palmier du Sénégal
<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	Faux dattier, Dattier nain, Dattier du Mékong

<i>Pinus taeda</i> L.	Pin à encens
<i>Pistacia vera</i> L.	Pistachier
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé, Plantain étroit
<i>Platanus</i> sp.	Platanes
<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass.	Géri tout
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Polygala myrtifolia</i> L.	Polygale à feuilles de myrte
<i>Polygonum arenastrum</i> Boréau	<i>Polygonum arenastrum</i>
<i>Polygonum lapathifolium</i> (L.) Delarbre	Renouée à feuilles d'oseille
<i>Polygonum persicaria</i> Gray	Renouée persicaire
<i>Populus fremontii</i> S. Watson	Peuplier de Fremont
<i>Portulaca</i> sp.	Pourpiers
<i>Prunus</i> sp.	Prunus
<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	Nashi
<i>Quercus</i> sp.	Chênes
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante, Bouton d'or
<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Nerprun alaterne
<i>Rhus diversiloba</i> Torr. & A. Gray	Sumac de l'Ouest
<i>Rosa californica</i> Cham. & Schidl.	Rosier de Californie
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romarin
<i>Rubus</i> sp.	Ronces
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue
<i>Salix</i> sp.	Saules
<i>Salsola tragus</i> L.	Soude roulante
<i>Salvia mellifera</i> Greene	Sauge mellifère
<i>Sambucus</i> sp.	Sureaux
<i>Sapindus saponaria</i> L.	Savonnier
<i>Schinus molle</i> L.	Faux-polvrier
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun
<i>Setaria magna</i> Griseb.	<i>Setaria magna</i>
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon-Marie
<i>Simmondsia chinensis</i> (Link) C. K. Schmidt.	Jojoba
<i>Sisymbrium irio</i> L.	Roquette jaune
<i>Solanum americanum</i> Mill.	Brède morelle, Morelle d'Amérique
<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Morelle jaune, Morelle à feuilles de châtaf
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Sonchus</i> sp.	Laiterons
<i>Sorghum</i> sp.	Sorgho
<i>Spartum junceum</i> L.	Genêt d'Espagne
<i>Spermacoce latifolia</i> Aubl.	Herbe à marcomet, Herbe à cornette
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron blanc ou Mouron des oiseaux.
<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	Mousse espagnole, fille de l'air ou barbe de vieillard
<i>Toxicodendron diversilobum</i> (Torr. & A. Gray) Greene	Sumac de l'Ouest
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc, Trèfle rampant

<i>Ulmus americana</i> L.	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i> Nutt.	Orme du Texas
<i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt.	Laurier de Californie, Myrte de l'Oregon
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie, Ortie dioïque
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante, Petite ortie, Ortie grèque
<i>Vaccinium</i> sp.	Myrtille, Airelle
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verveine littorale
<i>Veronica</i> sp.	Véroniques
<i>Vicia faba</i> L.	Fève, Féverole
<i>Vinca</i> spp.	Pervenches
<i>Vitis</i> sp.	Vignes
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce	Westringia ligneux, Romarin d'Australie
<i>Westringia glabra</i> L.	Violette de Westringia
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruits

Annexe 2 : liste des végétaux hôtes

<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge
<i>Acer platanoides</i>	Érable plane
<i>Acer griseum</i>	Érable à écorce de papier
<i>Alnus rombifolia</i>	Aulne blanc
<i>Ambrosia trifida</i>	Grande herbe à poux
<i>Ampelopsis cordata</i>	Vigne vierge
<i>Carya illinoensis</i>	Pacancier (noix de pécan)
<i>Celtis occidentalis</i>	Micocoulier de Virginie
<i>Cercis canadensis</i>	Gainier du Canada
<i>Cercis occidentalis</i>	Cercis occidentalis
<i>Chionanthus sp.</i>	Arbre de neige, Arbre à franges
<i>Citrus sp.</i>	Citrus
<i>Encelia farinosa</i>	Encelia
<i>Fraxinus americana</i>	Frêne blanc, Frêne d'Amérique, Franc frêne
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge, Frêne rouge de Pennsylvanie
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginkgo
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Févier d'Amérique
<i>Helianthus annuus</i>	Tournesol (des jardins)
<i>Iva annua</i>	Iva
<i>Koeleria bispinnata</i>	Savonnier de chine
<i>Lagerstroemia indica</i>	Lilas des Indes
<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar (Copalme d'Amérique)
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipier de Virginie
<i>Lupinus villosus</i>	Lupin chevelu
<i>Olea europaea</i>	Olivier
<i>Platanus occidentalis</i>	Platane
<i>Polygala myrtifolia L.</i>	Polygale à feuilles de myrte
<i>Prunus persica</i>	Pêcher
<i>Prunus dulcis, Prunus amygdalus</i>	Amandier
<i>Prunus domestica</i>	Prunier
<i>Prunus cerasifera</i>	Prunier cerise
<i>Quercus coccinea</i>	Chêne beige
<i>Quercus falcata</i>	Chêne rouge du sud
<i>Quercus laevis</i>	Chêne turc
<i>Quercus macrocarpa</i>	Chêne à gros fruits
<i>Quercus nigra</i>	Chêne noir
<i>Quercus palustris</i>	Chêne des marais
<i>Quercus phellos</i>	Chêne à feuilles de saule
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique
<i>Quercus shumardii</i>	Chêne de Schumard
<i>Ratibida columnaris</i>	Ratibida en colonne, Sombrero / Chapeau mexicain
<i>Rubus sp.</i>	Ronces
<i>Salvia mellifera</i>	Sauge mellifère
<i>Sapindus saponaria</i>	Savonnier
<i>Solidago virgaurea</i>	Verge d'or, Solidage verge d'or
<i>Spartium junceum L.</i>	Genêt d'Espagne

<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique
<i>Ulmus crassifolia</i>	Orme du Texas
<i>Vaccinium sp.</i>	Myrtille, Airelle
<i>Vinea sp.</i>	Pervenches
<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde d'Orient, Lampourde à gros fruit